Paisajes

Título: Los canutos del P.N. de Los Alcornocales **Autoría**: M.T. Vizoso **Lugar**: Rio de la Miel, Algeciras, Parque Natural de Los Alocornocales (Cádiz). **Fecha**: 13/05/2005 **Descripción**: Los denominados "Canutos" son bosques en galeria enriquecidos con elementos subtropicales procedentes del Terciario que quedan acantonados en los valles profundos y estrechos de las provincias de Cádiz y Málaga. Están formados por alisedas con laureles, rododendros, avellanillos, durillos, acebos y helechos, poco comunes en nuestros bosques.

+info

Título: Fijación de los sistemas dunares móviles **Autoría**: M.T. Vizoso **Lugar**: Punta Palomas, Ensenada de Valdevaqueros, Tarifa (Cádiz). **Fecha**: 14/05/2005 **Descripción**: Estabilización de los sistemas dunares móviles por el barrón, Ammophila arenaria. Esta gramínea contribuye de manera efectiva a la estabilización de las dunas permitiendo que después se introduzcan especies de mayor porte como la retama, la sabina mora o el pino piñonero.

+info

Título: Pinsapar en la Sierra de las Nieves **Autoría**: M.T. Vizoso **Lugar**: Puerto de los Pilones, Sierra de las Nieves, Ronda (Málaga). **Fecha**: 25/11/2006 **Descripción**: Pinsapares, bosques de abeto andaluz (Abies pinsapo), en el piso supramediterráneo con ombroclima húmedo-hiperhúmedo. Corresponden a formaciones que proceden de una época glacial pasada y que han quedado relegadas a las altas montañas pteridotiticas de la Serranía de Ronda en las que se mantienen unas condiciones climáticas adecuadas a su desarrollo.

+info

Título: Quejigales de alta montaña **Autoría**: M.T. Vizoso **Lugar**: Puerto de los Pilones, Sierra de las Nieves, Ronda (Málaga) **Fecha**: 25/11/2006 **Descripción**: Quejigal, de Q. faginea subsp. alpestris, propio de las altas montañas calizas de la Serranía de Ronda (Sierra de las Nieves y de Tolox), entre los 1.600 y 1.800 m, piso supramediterráneo con ombroclima húmedo-hiperhúmedo. Forma parte de bosques caducifolios del Daphno-Aceretum granatense quercetosum alpestris. Se conoce una única población muy deteriorada por el envejecimiento de la misma y los problemas de erosión y presión ganadera a los que está sometida.

+info