


Francisco Perez-Vera

Les Orchidées de Côte d'Ivoire



Ouvrage publié en
collaboration avec



Parthénope
COLLECTION

Toute l'équipe de BIOTOPE est heureuse de vous présenter
le sixième volume de la collection PARTHÉNOPE :

Les Orchidées de Côte d'Ivoire

Francisco Perez-Vera.

Référence bibliographique à utiliser :

PEREZ-VERA, F., 2003 - Les Orchidées de Côte d'Ivoire.
Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 576 p.

Fruit de quarante ans de travail, cet ouvrage est un véritable monument. En exerçant son métier de médecin gynécologue-obstétricien jusque dans les zones les plus reculées de la Côte d'Ivoire, « Paco » Perez-Vera, a réuni une somme d'informations unique sur les orchidées ivoiriennes : *connaissance des espèces, répartition, écologie, mais aussi dessins d'une exceptionnelle précision, et photographies en couleur de taxons très rarement photographiés. Nous sommes très heureux d'avoir la chance de l'éditer.*

Le travail préparatoire de ce livre nous a également donné l'occasion de rencontrer un ami dont la gentillesse, l'humour et le talent forcent l'admiration. Merci à Paco d'être celui qu'il est.

Enfin, nous ne pouvons manquer d'avoir une pensée pour la Côte d'Ivoire et ses merveilleux habitants qui souffrent aujourd'hui d'une situation dramatique.

Puissent ces quelques fleurs les aider à trouver le chemin de la paix.

Frédéric Melki et Michel Geniez,
pour l'équipe de Biotope.



Vous pouvez vous procurer cet ouvrage à l'adresse suivante :

BIOTOPE


22, boulevard Maréchal Foch, BP 58, 34140 Mèze

Contact : Olivier LARREY, responsable des ventes (e.mail : olarrey@biotope.fr)

Tél. : (33) 04 67 18 46 26 - Fax : (33) 04 67 18 46 29 - Sur internet : www.biotope.fr

Les Orchidées de Côte d'Ivoire

par Francisco Perez-Vera



Bulbophyllum calyptratum KRAENZL.
var. *calyptratum*

A. Plante x 0,9 ;

B. Fleur x 4,8 ;

C. Tépales x 4,8 ;

D. Colonne et
labelle x 9,6.

FPV-75

Chamaeangis pauciflora PEREZ-VERA SP. NOV.

Affinis C. vesicata sed inflorescentiae usque ad 2-4 rami, flores ad nodos singuli differt.

Type : Côte d'Ivoire : F. Perez-Vera 275, Forêt de Zagné, mai 1972, (holo- UCJ) ; iso- ABI, hpv, K, P).

Etymologie : Pendant des années et avant sa publication, ce taxon fût considéré comme une variété '*pauciflora*', du latin *paucis* (peu) et *flos* (fleur), de *Chamaeangis vesicata*, dénomination qui met en évidence sa principale caractéristique de posséder une seule fleur par nœud dans l'inflorescence. L'appellation a été conservée dans sa description avec rang d'espèce.

Description

Plante épiphyte, à tige courte de 3-6 cm, et feuilles distiques très rapprochées, linéaires, lancéolées, aiguës, très charnues, de 10-30 x 0,7-1,5 cm ; inflorescences décombantes, souvent branchées, avec bractées minutes et entre-nœuds écartés de 3-6 mm ; fleurs petites, de couleur jaune ; tépales étroitement lancéolés, aigus, de 2-3,5 mm, les pétales plus petits ; labelle entier, réfléchi, très semblable aux sépales, avec un éperon cylindrique peu recourbé de 4,5-7 mm, modérément renflé à l'apex ; colonne de 1 mm avec long rostellum triangulaire ; deux pollinies avec deux stipites élargis à la base et un viscidium commun.

L'aspect général de la plante se rapproche de celui de *C. vesicata* mais les feuilles sont beaucoup plus charnues, presque aussi épaisses que larges ; les fleurs également, diffèrent par un pédicelle et un ovaire plus longs et plus incurvés. Les tépales sont plus étroits et plus aigus et l'éperon possède un renflement distal moins important. De plus, les inflorescences sont souvent 2-3 branchées avec une seule fleur par nœud, 2 fois plus espacées que chez *C. vesicata*.

Le premier spécimen de cette plante fut récolté en Mai 72 et faussement identifié comme *C. lanceolata* SUMMERH. à cause de son inflorescence plutôt lâche avec une fleur par nœud. Quelques années plus tard, lors de la trouvaille et de l'identification de la vraie *C. lanceolata*, le spécimen en question et plusieurs autres, récoltés en régions limitrophes, furent considérés comme une variété '*pauciflora*' de *C. vesicata*. Dans les dernières années, la persistance de cette forme, la singularité de sa répartition géographique et la constance des dates de floraison, nous ont incité à décrire ce taxon au rang d'espèce.

Distribution géographique

Côte d'Ivoire.

PARATYPES : Côte d'Ivoire : Man à Danané (Juill. 1973) PV 275/B (K) ; Danané à Guinée (Juill. 1974) PV 677 (hpv).


Habitat

Forêt pluviale sempervirente de basse et de moyenne altitude, en situation ombragée.

Floraison

Mai à juillet.

- Ci-contre : *Chamaeangis pauciflora* PEREZ-VERA.
 A. Plante x 0,6 ;
 B. Inflorescence x 2 ;
 C. Fleurs x 4 ;
 D. Tépales x 10 ;
 E. Colonne et labelle x 10 ;
 F. Colonne et pollinies x 16 ;
 G. Fruit x 1 et section x 2,5.



F.V. 73