

579
(46)
188

SCHEDAE
AD
FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. II-III
Dec. 1935

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE
Apart. 593
BARCINONE

S C H E D A E
A D
FLORAM IBERICAM SELECTAM

CB:402625

579
(46)
I.B.B.

SCHEDAE
AD
FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. II-III

Dec. 1935

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE
Apart. 593
BARCINONE

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. II

Dec. 1935

101. *Isoetes lacustris* L.

Sp. pl., ed. 1, p. 1100 (1753).

ASTURIA: in aquis nitidis, l. Laguna de Arvas dicto, supra Leitariegos, ad 1700 m alt.

Leg. Font Quer et Rothmaler, 5 aug. 1935.

102. *Ephedra fragilis* Desf.

Fl. Atl., II, p. 372 (1800). *1799* *1799*

α *Desfontainii* Stapf.

Die Art. Gat. *Ephedra*, p. 54 (1889). — *E. altissima* Boiss.,
e loco, non Desf.

BAETICA: in rupestribus prope Alhaurín de la Torre (Málaga), ad
200 m alt.

Leg. Gros, 20 maji 1926.

Fl. Aust. (1852)

major Host 1832

103. *Ephedra scoparia* Lange

Pugillus pl. nov., II, p. 83 (1861) et Descr. pl. nov.,
p. 19, tab. XXXII (1864).

CASTELLA NOVA: in collibus gypsaceis l. Cerros de Reagajal, c. Aran-
juez, ad 500 m alt. Loc. clas.

Leg. Font Quer et Gros, 16 maji 1924.

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. III

Dec. 1935

201. *Poa minor* Gaud.

Fl. Helv., I, p. 253 (1828).

ssp. *nevadensis* Nannf. nov. ssp.

Poa laxa Boiss., Voy. Bot. Esp., II, p. 659, non Haenke.

BAETICA: in schistosis montium Sierra Nevada, l. Cerro de la Alca-zaba dicto, ad 3000 m alt. Cotypus.

Leg. Font Quer, 28 aug. 1923.

Obs.: Differt a typo foliis tenuioribus, planis; ligulis brevioribus (2 mm non excedentibus); spiculis angustioribus et longioribus; floribus distantioribus; glumis valde inaequalibus; gl. I 2-2,5 mm longis, gl. II 2,2-3,0 mm; antheris paulo longioribus et angustioribus (longit. 1,1-1,3 mm). - J. A. NANNFELDT.

202. *Avena crassifolia* Font Quer

in Butll. Inst. Cat. d'Hist. Nat., 1920, p. 189, et
Illustr. Fl. occid., p. 7, t. X (1926).

PRITYUSAE: in rupestribus maritimis l. Cala de Santa Agnès dicto,
insulae Ebusi, solo calcareo, ad 10 m alt. Loc. clas.

Leg. Gros, 12 julii 1935.

Vid. Font Quer.

203. *Avena sulcata* Gay

ap. Dur., Pl. astur. exs., 176 (1836).

ASTURIA: in rupestribus schistosis montis «Cuetos de Arvas» dicti,
supra Leitariegos, ad 1650 m alt. Loc. clas.

Leg. Font Quer et Rothmaler, 15 jul. et 6 aug. 1935.

260. *Sideritis lurida* Gay

ap. Dur., Pl. astur. exs., 248 (1836).

f. *spicis elongatis*

ASTURIA: in saxosis arenaceis supra l. Laguna de Arvas, pr. Leitariegos, ad 1700 m alt. Loc. clas.

Leg. Font Quer et Rothmaler, 5 aug. 1935. Det. Font Quer.

Obs.: Optima species ab auctoribus vix cognita. Maxime affinis *Sideritidi ovatae* Cav., et cum *S. grandiflora* Salzm. in seriem novam *Stoloniferae* subsectionis *Carpostegiatae*, quae plantas cum rhizomate stolonifero comprehendit, collocanda. — FONT QUER.

261. *Sideritis Bubanii* Font Quer

in Butll. Inst. Cat. H. N., XX, p. 141 (1930). — *Fracastora linearifolia* Bub., Fl. pyr., I, p. 457 (1897), non *Sideritis linearifolia* Lamk.

CATALAUNIA: in declivibus argilloso-calcareis inter Martinet et Bellver, pr. Seu d'Urgell, ad 970 m alt., cum *Genista Scorpio*, *Satureja montana*, *Lavandula latifolia* et *L. pyrenaica*, *Helianthemo vulgare*, *Thymo vulgare*, *Bupleuro falcato*, *Lino salsoloide*, *Bromo erecto*, *Astragalo monspessulanus*, *Lithospermo fruticoso*, etc. Cotypus e loco Bubanii.

Leg. Font Quer, 4 julii 1920.

Det. Font Quer.

262. *Sideritis serrata* Lag.

Gen. et sp., p. 18 (1816).

MURCIA: in declivibus argillosis, aridis, l. Sierra de Benú, prope Tobarra, ad 700 m alt. Loc. clas. atque unico.

Leg. Font Quer, 15 julii 1919.

Det. Font Quer.