

NOTAS TAXONOMICAS Y COROLOGICAS PARA
LA FLORA VASCULAR DE ANDALUCIA Y DEL RIF. 23-27

INDICE

23. SOCORRO, O., M. L. ARREBOLA & M. C. ESPINAR. Contribución al conocimiento de la flora de Granada. Nota IV	185
24. VALDÉS, B. <i>Matthiola masguindali</i> pau.....	187
25. HELLMANN, R. & V. HELLMANN <i>Pilularia minuta</i> Durieu (Marsileaceae) and <i>Littorella uniflora</i> (L.) Ascherson (Plantaginaceae) in south west Andalusia.....	189
26. ALBAREAL, J. & C. ROMERO ZARCO Novedades florísticas para la Campiña y las Sierras Subbéticas Sevillanas.....	190
27. AIT LAFKIH, M., S. L. JURY & M. REJDALI. Herbarium specimens collected in Morocco held in British and Irish Herbaria.....	193

23. CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA
DE GRANADA. NOTA IV

O. SOCORRO, M. L. ARREBOLA & M. C. ESPINAR

Departamento de Biología Vegetal. Facultad de Farmacia. Universidad
de Granada.

Este trabajo es continuación de los iniciados por uno de nosotros: SOCORRO & PÉREZ RAYA (1981), SOCORRO (1982) y SOCORRO & AROZA (1987).

Ononis saxicola Boiss. & Reuter

Iznalloz, Sierra de Harana, proximidades a Cueva del Agua (30SVG53), 1750 m, 23.VI.1988, GDA 21376.

Rara, en roquedos calizo-dolomíticos. Hasta el momento sólo ha sido señalada su presencia en la provincia, en el Trevenque (Sierra Nevada) por S. GUTIERREZ (COLMEIRO, 1886:94).

Plantago asperrima (Gand.) Hervier

Cogollos Vega, Sierra de Cogollos, proximidades a Peñón de la Mata (30SVG52), 1450 m, 22.V.1988, GDA 21359.

Escasa, en matorrales nitrófilos. Novedad provincial.

Rochelia disperma (L. fil.) C. Koch subsp. **retorta** (Pallas) E. Kotejowa.

Cogollos Vega, Sierra de Cogollos, proximidades a Cortijo de los Hoyos (30SVG52), 1350 m, 22.V.1988, GDA 21288 y 21289.

Escasa, en pastizales terofíticos sobre suelos poco profundos y básicos.

Stachys heraclea All.

Cogollos Vega, Sierra de Cogollos, próximo a Cortijo del Moralejo (30SVG52), 1440 m, 17.VII.1988, GDA 21344.

Rara, en lugares ruderalizados. Novedad provincial.

Teucrium thymifolium Schreber

Puebla de D. Fadrique, entre Puebla de D. Fadrique y Cañada de Cañepa, a 18 Km del primero (30SWG58), 1000 m, 22.VI.1988, GDA 22577.

Frecuente, en matorrales sobre suelos margoso-yesosos. Novedad provincial.

Thymus x beltrani Socorro, Espinar & Arrebola, **hybr. nov.**

(= *T. membranaceus* Boiss. x *T. orospedanus* H. del Villar.)

A *T. membranaceus* ramis rubentibus; foliis caulibus linearibus valde revolutis, basi vel tertia inferiore ciliatis; foliis floralibus virentibus vel partialis purpurascensibus, supra puberulis, subtus pubescentibus, differt. A *T. orospedanus* foliis floralibus ovalis, latioribus, subtus nervosis; calycis cilindricis, majoribus (4 mm); corollis plus longioribus (12 mm); antheris albis, differt.

Hanc hybridam speciem ad nostram comitem et amican Esperanza Beltrán Tejera dicamus.

Holotypus. Puebla de D. Fadrique, entre Puebla de D. Fadrique y Cañada de Cañepa, a 20 Km del primero (30SWG58), 1100 m, in locis aridis margaceis et gypsaceis, 22.VI.1988, O. Socorro (GDA 22579). *Isotypi*: GDA 22580 y SEV.

De *T. membranaceus* difiere por sus ramas rojizas; hojas lineares muy revueltas por sus márgenes, ciliadas en su base o tercio inferior, con cilios manifiestos; brácteas verdes o parcialmente púrpuras, pubéculas por el haz, pubescentes por el envés; cálices pubéculos o pubescentes. De *T. orospedanus* difiere por sus brácteas ovales, anchas, exteriormente con nervios más o menos marcados; cálices cilíndricos, mayores (4 mm); corolas mayores (12 mm); anteras blancas.

Además de estos caracteres, resaltar la presencia, incluso en un mismo pie, de corolas blancas propias de *T. membranaceus* y de otras rosas o púrpuras de *T. orospedanus*.

Thymus membranaceus Boiss.

Puebla de D. Fadrique, entre Puebla de D. Fadrique y Cañada de Cañepla, a 20 Km del primero (30SWG58), 1100 m, 22.VI.1988, GDA 22581.

Frecuente, en tomillares sobre suelos margoso-yesosos. De acuerdo con la distribución dada por R. MORALES (1986:193), constituye una novedad provincial.

Trigonella gladiata Steven ex Bieb.

Cogollos Vega, Sierra de Cogollos, Cerro de los Conejos (30SVG52), 1250 m, 21.V.1988, GDA 20873.

Rara, en lugares pedregosos calizos ligeramente nitrificados. Novedad provincial.

Vella pseudocytisus L.

Puebla de D. Fadrique, entre Puebla de D. Fadrique y Cañada de Cañepla, a 18 Km del primero (30SWG58), 1000 m, 22.VI.1988, GDA 22576.

Escasa, en matorrales sobre suelos margoso-yesosos. La única cita que conocemos para Andalucía (falda de la Sierra de María) se debe a BOURGEOU (COLMEIRO 1885:259).

BIBLIOGRAFIA

- COLMEIRO, M. (1885-1889) *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana e Islas Baleares*. 5 vols. Fuentenebro. Madrid.
- MORALES, R. (1986) Taxonomía de los géneros *Thymus* (excluida la sección *Serpyllum*) y *Thymbra* en la Península Ibérica. *Ruizia* 3.
- SOCORRO, O. (1982) Contribución al conocimiento de la flora de Granada. Nota II: algunas plantas de Sierra Harana. *Trab. Dep. Bot. Univ. Granada* 7: 53-62.
- & F. PÉREZ RAYA (1981) Contribución al conocimiento de la flora de Granada. Nota I. *Anales Jard. Bot. Madrid* 38(1): 173-179.
- & P. AROZA (1987) Contribución al conocimiento de la flora de Granada. Nota III. *Studia Botanica* 6: 123-128.

24. MATTHIOLA MASGUINDALI PAU

B. VALDÉS

Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Sevilla.

PAU (Cavanillesia 1: 137, 1929) describió una nueva especie de *Matthiola* con el nombre *M. masguindali*, a partir de material recolectado por Mas Guindal en «Djebel Dersa» (Tetuán). En su descripción indica, entre otros caracte-