

579

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

SCHEDAE  
AD  
FLORAM IBERICAM SELECTAM

Dec. 1888

IMPENSIS FRANTIS BARCELONENSIS  
MDCCLXXXVIII  
BARCELONA



aleph

# SCHEDAE

AD

## FLORAM IBERICAM SELECTAM



Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

2° 13185

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS  
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. I

Dec. 1934

1. *Davallia canariensis* (L.) Sm.

in Mem. Ac. Turin, V, p. 414, t. 9, fig. 6 (1793). – *Trichomanes canariensis* L., Sp. pl., ed. I, p. 109 (1753).

BAETICA: Sierra de Palma, pr. Los Barrios (Cádiz), ad 100 m alt.

Leg. Gros, 8 maji 1922.

WELYTERIS POZOI (LAG.) C. V. MORTON 1959 Bull. Soc. Bot. Fr. 101 239

2. *Pleurosorus Pozoi* (Lag.) Diels

Nat. Pfl.-Fam., I, 4, p. 245 (1893) – *Hemionitis Pozoi* Lag., Gen. et Spec., p. 33 (1816). – *Ceterach Pozoi* A. Br. ap. Milde, in Bot. Zeit., 1866, p. 310. – *Grammitis hispanica* Coss., Not. quelqu. pl. Esp., p. 48 (1849). – *Ceterach hispanicum* Mett., Fil. Hort. Lips., p. 80 (1856).

BAETICA: in fissuris rupium calcareum umbrosis prope Grazalema, ad 1000 m alt.

Leg. Font Quer, 30 junii 1925.

3. *Cheilanthes hispanica* Mett.

in Abh. Senkenb. Naturf. Ges., 1859-61, <sup>II</sup>p. 74.

BAETICA: Sierra Morena, l. «Estrecho de Piedra Galana» dicto, prope Despeñaperros, solo schist., ad 600 m alt.

Leg. Gros, 12 oct. 1925.

4. *Agrostis delicatula* Pourr. ex LAPEYR. 1818

(*Chloris* Hisp., ined.) ap. Kunth, Enum., I, p. 291 (1833) teste Pau.

CASTELLA NOVA: in arenosis prope Navacepeda (Avila).

Leg. Gros, 27 julii 1924.



## 86. *Asperula Paui* Font Quer

Buttl. Inst. Cat. Hist. Nat., 1920, p. 188.

var. *dianensis* Font Quer

l. c., 1926, p. 57.

VALENTIA: in rupibus calcareis, l. Barranc de Mascarat dicto, prope Calp, ad 50 m alt. Cotypus.

Leg. Font Quer, 13 maji 1923.

## 87. *Pterocephalus diandrus* Lagasca

Gen. et sp., p. 9 (1816). — *Scabiosa diandra* Lagasca, Var. de Cienc., IV, p. 39 (1805).

CASTELLA NOVA: in arenosis sterilibus juxta Torreledones, prope Madrid. Loc. class.

Leg. González Guerrero, 7 julii 1927.

## 88. *Scabiosa tomentosa* Cav.

Icones, II, p. 66, tab. 183 (1793).

VALENTIA: Serra Mariola, in saxosis rupestribusque calc. querceti ilicis depauperati, ad 1300 m alt., l. Montcabrer, cum *Brachypodio ramoso*, *Herniaria suffruticosa*, *Ulice parviflora*, *Genista Scorpio*, *Bupleuro frutescente*, *Salvia officinale*, *Phlomis Lychnitide*, *Teucrio Polio fma.*, *Carduncello monspeliense*, *Santolina Chamaecyparisso*, *Stachelina dubia*, etc. Loc. class.

Leg. Font Quer, 25 julii 1934.

## 89. *Jasione foliosa* Cav.

Icones, II, p. 38, t. 148, fig. 1 (1793).

VALENTIA: Serra Mariola, in fissuris rupium calc. l. Montcabrer dicto, ad 1350 m alt., cum *Carice Halleriana*, *Festuca Hystrice*, *Silene Saxifraga*, *Potentilla caulescente*, *Poterio rupicolo*, *Draba hispanica*, *Ononide aragonense*, *Hyperico ericoide*, *Teucrio buxifolio*, *Linaria Cavánillesii*, *Crepide albida*, *Hieracio mariolense*, etc. Loc. class.

Leg. Font Quer, 25 julii 1934.