

579

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

SCHEDAE
AD
FLORAM IBERICAM SELECTAM

Dec. 1888

IMPENSIS REGIAE ACADEMIAE BARCELONENSIS
MCMX

aleph

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM



Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

2° 13185

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. I

Dec. 1934

1. *Davallia canariensis* (L.) Sm.

in Mem. Ac. Turin, V, p. 414, t. 9, fig. 6 (1793). – *Trichomanes canariensis* L., Sp. pl., ed. I, p. 109 (1753).

BAETICA: Sierra de Palma, pr. Los Barrios (Cádiz), ad 100 m alt.

Leg. Gros, 8 maji 1922.

WELYTERIS POZOI (LAG.) C. V. MORTON 1959 Bull. Soc. Bot. Fr. 101 239

2. *Pleurosorus Pozoi* (Lag.) Diels

Nat. Pfl.-Fam., I, 4, p. 245 (1893) – *Hemionitis Pozoi* Lag., Gen. et Spec., p. 33 (1816). – *Ceterach Pozoi* A. Br. ap. Milde, in Bot. Zeit., 1866, p. 310. – *Grammitis hispanica* Coss., Not. quelqu. pl. Esp., p. 48 (1849). – *Ceterach hispanicum* Mett., Fil. Hort. Lips., p. 80 (1856).

BAETICA: in fissuris rupium calcareum umbrosis prope Grazalema, ad 1000 m alt.

Leg. Font Quer, 30 junii 1925.

3. *Cheilanthes hispanica* Mett.

in Abh. Senkenb. Naturf. Ges., 1859-61, p. 74.

BAETICA: Sierra Morena, l. «Estrecho de Piedra Galana» dicto, prope Despeñaperros, solo schist., ad 600 m alt.

Leg. Gros, 12 oct. 1925.

4. *Agrostis delicatula* Pourr. ex LAPEYR. 1818

(*Chloris* Hisp., ined.) ap. Kunth, Enum., I, p. 291 (1833) teste Pau.

CASTELLA NOVA: in arenosis prope Navacepeda (Avila).

Leg. Gros, 27 julii 1924.

93. *Centaurea segobricensis* Pau

(*C. aspera* × *seridis* Pau)

in *Broteria*, Ser. Bot. XXII, fasc. III, p. 118 (1926).

VALENTIA: in arenosis ad ripas fluminis Palancia, l. Las Toscas (Segorbe) dicto, inter parentes, ad 300 m alt. Cotypus.

Leg. Pau, mense junio 1925.

94. *Centaurea pinae* Pau

Notas Botánicas, I, p. 12 (1887).

VALENTIA: in collibus calcareis montium «Sierra de Pina», ad 1000 m alt. Loc. class.

Leg. Pau, 16 junii 1923.

95. *Centaurea carratracensis* Lange

Diagn. pl. iber., II, n.º 3 (1881).

BAETICA: in pinguibus rupestribusque prope Carratraca (Málaga), ad 400 m alt. Loc. class.

Leg. C. Vicioso, 20 junii 1930.

96. *Centaurea citricolor* Font Quer

Illustr. Fl. Occid., I, p. 7, t. IX (1926).

BAETICA: Sierra Morena, in schistosis l. «Valdeflores», prope Despeñaperros, ad 800 m alt. Cotypus.

Leg. Gros, 26 junii 1924.