

579
(46)
188

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. II-III

Dec. 1935

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE

Apart. 593

BARCINONE

9
B.

SCHEDAE
AD
FLORAM IBERICAM SELECTAM

WILHELMUS BARGINONENSIS

BARCELONAE

CB: 402625

579
(46)
i. B. B.

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. II-III

Dec. 1935

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE

Apart. 593

BARCINONE

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. II

Dec. 1935

101. *Isoetes lacustris* L.

Sp. pl., ed. 1, p. 1100 (1753).

ASTURIA: in aquis nitidis, l. Laguna de Arvas dicto, supra Leitariegos, ad 1700 m alt. !

Leg. Font Quer et Rothmaler, 5 aug. 1935.

102. *Ephedra fragilis* Desf.

Fl. Atl., II, p. 372 (1800). 1799 1799 !

α *Desfontainii* Stapf.

Die Art. Cat. *Ephedra*, p. 54 (1889). – *E. altissima* Boiss., e loco, non Desf.

BAETICA: in rupestribus prope Alhaurín de la Torre (Málaga), ad 200 m alt.

Leg. Gros, 20 maji 1926.

Fl. Austr. (1852) II: 67

major Host 1832

103. *Ephedra scoparia* Lange

Pugillus pl. nov., II, p. 83 (1861) et Descr. pl. nov., p. 19, tab. XXXII (1864). !

CASTELLA NOVA: in collibus gypsaceis l. Cerros de Reagajal, c. Aranjuez, ad 500 m alt. Loc. clas.

Leg. Font Quer et Gros, 16 maji 1924.

INSTITUTUM BOTANICUM BARCINONENSE
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. III

Dec. 1935

201. *Poa minor* Gaud.

Fl. Helvet., I, p. 253 (1828).

ssp. *nevadensis* Nannf. nov. ssp.

Poa laxa Boiss., Voy. Bot. Esp., II, p. 659, non Haenke.

BAETICA: in schistosis montium Sierra Nevada, l. Cerro de la Alcazaba dicto, ad 3000 m alt. Cotypus.

Leg. Font Quer, 28 aug. 1923.

Obs.: Differt a typo foliis tenuioribus, planis; ligulis brevioribus (2 mm non excedentibus); spiculis angustioribus et longioribus; floribus distantioribus; glumis valde inaequalibus; gl. I 2-2,5 mm longis, gl. II 2,2-3,0 mm; antheris paulo longioribus et angustioribus (longit. 1,1-1,3 mm).—J. A. NANNFELDT.

202. *Avena crassifolia* Font Quer

in Butll. Inst. Cat. d'Hist. Nat., 1920, p. 189, et Illustr. Fl. occid., p. 7, t. X (1926).

PTYUSAE: in rupestribus maritimis l. Cala de Santa Agnès dicto, insulae Ebusi, solo calcareo, ad 10 m alt. Loc. clas.

Leg. Gros, 12 julii 1935.

Vid. Font Quer.

203. *Avena sulcata* Gay

ap. Dur., Pl. astur. exs., 176 (1836).

ASTURIA: in rupestribus schistosis montis «Cueto de Arvas» dicti, supra Leitariegos, ad 1650 m alt. Loc. clas.

Leg. Font Quer et Rothmaler, 15 jul. et 6 aug. 1935.

284. × *Carduus arvaticus* F. Q. et Rothm.

nov. hybr.

(*C. medius* × *C. phyllolepis*)

ASTURIA: in declivibus herbosis l. Valgrande, pr. Puerto de Pajares, in pago Arvas, ad 1360 m alt., inter parentes. Typus.

Leg. Font Quer et Rothmaler, 11 aug. 1935.

Obs.: Planta inter *C. medium* et *phyllolepidem* media, capitulis longe pedunculatis, rubris, magnitudine eorum *C. phyllolepidis*, phyllis purpurascens, latioribus et magis reflexis quam eae *C. medii*. — FONT QUER ET ROTHMALER.

285. *Carduus medius* Gouan



Ill. Bot., p. 62, t. 24 (1773).

ASTURIA: in locis herbosis et lapidosis prope Leitariegos, ad 1500 m alt.

Leg. Font Quer et Rothmaler, 6 aug. 1935.

286. *Cirsium hispanicum* (Lam.) F. Q. et Rothm.

nov. comb.

Chamaepeuce hispanica (Lam.) DC., Prodr., VI, p. 685 (1837).
— *Carduus hispanicus* Lam., Encycl. méth., I, p. 701 (1783).
BAETICA: in rupestribus schistosis montium de la Axarquia dict., ad 600 m alt. Terra clas.

Leg. Laza, 5 aug. 1935.