

P. 1024

Treballs de l'Institut Botànic  
de Barcelona

VOL. XII

Les campanyes botàniques  
de Pius Font i Quer  
al Nord d'Àfrica

Antonio González Bueno

amb la col·laboració de  
J. M. Montserrat Martí  
I. Sistané Salas  
A. Susanna de la Serna



Ajuntament de Barcelona


Barcelona, 1988

P. 1024

13 SET. 1988

# Treballs de l'Institut Botànic de Barcelona

VOL. XII



## Les campanyes botàniques de Pius Font i Quer al Nord d'Àfrica

Antonio González Bueno

amb la col·laboració de  
J. M. Montserrat Martí  
I. Sistané Salas  
A. Susanna de la Serna



Ajuntament de Barcelona

Barcelona, 1988



INSTITUT D'ESTUDIS ILERDENCS

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

# **Catàleg de les novetats i observacions publicades als Iter Maroccanum per Pius Font i Quer**

per

A. González Bueno i I. Sistané Salas

amb la col·laboració de J.M. Montserrat-Martí i A. Susanna de la Serna

## **Introducció**

La llista de tàxons del catàleg correspon al contingut de les etiquetes, les quals s'han transcrit amb la màxima exactitud possible. L'elecció ha estat realitzada d'acord amb els criteris següents:

Quan les etiquetes continguessin qualche observació o descripció original de Font i Quer o de Pau.

Quan es proposés un nom nou.

Quan la nomenclatura utilitzada pogués correspondre a una nova proposició nomenclatural.

Quan la llista de sinònims fos, al nostre criteri, prou important o pogués implicar alguna dada d'interès taxonòmic.

L'índex final inclou tots els tàxons repartits llevat d'un buit en la relació de números de l'any 1930 que no ha estat possible localitzar. Es fa indicació expressa de l'any en què foren repartits així com dels números que corresponen a cada espècie. Entre claudàtors es fa esment de les noves propostes nomenclaturals inserides en els comentaris o les observacions que fan els autors de l'Iter, particularment quan no hi ha concordança de criteri entre Pius Font i Carlos Pau. Les espècies indicades en cursiva corresponen a les fitxes del catàleg.

En el text del catàleg hem utilitzat els claudàtors per indicar abreviatures o comentaris que introduïm nosaltres i que, per tant, no figuren en el text original de les etiquetes. Hem considerat necessàries aquestes modificacions per tal de fer-lo més comprensible.



Quan l'autor de l'Iter utilitza més d'un qualificatiu per a designar una forma o varietat noves entenem el conjunt com una descripció i no com una proposta nomenclatural concreta, ja que no sembla la intenció de l'autor proposar un nou nom de manera formal. En aquest cas els mots que segueixen, en l'etiqueta original, a l'abreviatura *fma.* o *var.* s'han col·locat darrera de la paraula *Descr.:* o *Obs.:* tancades entre claudàtors.

Per indicar els casos en què es repartí la mateixa planta en flor i fruit s'ha procedit de la manera següent: Quan coincideix la localitat i l'altitud indiquem, entre guions, l'estat de la planta, el número i la data. Quan els números corresponen a localitats diferents però la planta és la mateixa anotem, també entre els guions, la localitat en què fou recol·lectada la planta en fruit sense repetir, però, el nom de l'espècie.

Amb el contingut de les etiquetes dels Iter Maroccanum s'ha preparat una base de dades completa de totes les espècies repartides.

L'elecció dels tàxons que figuren en aquest catàleg, així com els índexs finals, ha estat feta per Immaculada Sistané i Josep M. Montserrat. Per tant han d'atribuir-se a aquests autors les omissions i errors que puguin observar-se en el catàleg o a l'índex final. Les correccions del conjunt del catàleg així com el tractament informàtic de les dades és també responsabilitat de les mateixes persones i d'A. Susanna de la Serna.

## ITER MAROCCANUM 1930

### 16. *Triglochin barrelieri* Lois.

var. **maurum** Pau

Hab. in arenosis humidis, inter Ceuta et Tetauen, l. d. Rincón de Medik, 4 m. alt., 13 martii.

### 17. *Triglochin barrelieri* Lois.

var. **maurum** Pau

Hab. in paludosis, ad ripas fl. Lukos, juxta El Araix, 1 januarii.

### 26. *Anthoxanthum odoratum* L., Sp. pl., ed. I, p. 28 (1753)

fma.

Hab. in quercetis faginae, supra Mexerah, ad 700 m. alt., 3 majii.  
[Descr.:] glabrata, laxiflora.

### 27. *Anthoxanthum odoratum* L.

fma.

Hab. in uliginosis, l. Bu-Xaren d., pr. El Araix, ad 40 m. alt., 19 aprilis.  
[Descr.:] Panicula glabra, nitida.

### 34. *Polypogon maritimum* Willd., Neue Schr. Ges. Naturf. Fr. Berl., III, p. 442 (1801)

fma. **altera**

Hab. in locis humidiusculis pr. Malalien, c. Tetauen, 18 majii.

### 42. *Weingartneria articulata* (Desf.) Asch. et Graebn., Syn. II, p. 301 (1899)

var. **gracilis** (Guss.)

Hab. in arenosis, pr. El Araix, 12 majii.

### 44. *Molinieria minuta* Parl., Fl. ital., I, p. 237 (1848)

*Aira lendigera* Lag. var. *mutica* Boiss.; *Mol. minuta* var. *baetica* Willk.

var. **mutica** (Boiss.) Pau

Hab. in arenosis, c. emp. Sok-el-Jemis-es-Sahel, c. El Araix, 25 martii.

692. *CHAMAEPEUCE ABYLENSIS* Pau et F. Q.; *Cirsium rhiphaeum* F. Q. ssp. *abylensis* F. Q., Index sem. H. B. Barc., 1931, p. 15.

*Hab.* in saxosis calc. ad pedem montis Dj. Musa, pr. Ceuta; 28 junii.

*Descr.:* Affinis Cham. rhiphaeae a qua caulibus robustioribus, foliis magis coriaceis, obscure viridibus, capitulis subglobosis, sassilibus, racemo elongato formantibus, superioribus aggregatis, anthodii bracteis brevioribus, minus acuminatis, corollis atropurpureis, differt.

689. *Nothobasis syriaca* (L.) Cass., Dict., XXV, p. 225 (1825)

fma. vel var. *gigantea*

*Hab.* in herbosis, juxta El Araix, ad 5 m. alt., 18 majii.

[*Descr.:*] caulibus usque ad 1,50 m. alt.

691. *Chamaepeuce rhiphae* Pau et F.Q., ap. F.Q., Iter maroc., 1927, n.º 690.

var. *tetuanensis* F.Q., ut *Cirsio*, Ind. sem. H. Mus. Barc., 1930, p. 15.

*Hab.* in saxosis calc. montis Gorgues (Beni Hosmar), ad 700 m. alt. Cotypus. 29 junii.

692. *Chamaepeuce abylensis* Pau et F.Q.

*Cirsium rhiphaeum* F.Q. ssp. *abylensis* F.Q., Index sem. H. B. Barc., 1931, p. 15.

*Hab.* in saxosis calc. ad pedem montis Dj. Musa, pr. Ceuta, 28 junii.

*Descr.:* Affinis Cham. rhiphaeae a qua caulibus robustioribus, foliis magis coriaceis, obscure viridibus, capitulis subglobosis, sa[e]ssilibus, racemo elongato formantibus, superioribus aggregatis, anthodii bracteis brevioribus, minus acuminatis, corollis atropurpureis, differt.

698. *Centaurea mauritanica* (F.Q.) Pau;

*Centaurea sempervirens* L. var. *mauritanica* F.Q. in Cavanillesia, 1930; *Centaurea sempervirens* L. subsp. *mauritanica* F.Q.

*Hab.* ad ripas rivulorum supra Xauen, l. Ras-el-ma, ad 1000 m. alt.; 29 julii.

699. *Centaurea incana* Desf., Fl. atl., II, p. 301 (1800)

var. *virens* Pau

*Hab.* in quercetis suberis degradatis, inter Tandja et Asaila, l. Cuesta Colorada dicto, ad 50 m. alt., 2 julii.