

579

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

SCHEDAE
AD
FLORAM IBERICAM SELECTAM

Dec. 1888

IMPRESSUM IN OFFICINA BARCHINENSIS
MDCCLXXXVIII
BARCELONA

aleph

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM



Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

2° 13185

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. I

Dec. 1934

1. *Davallia canariensis* (L.) Sm.

in Mem. Ac. Turin, V, p. 414, t. 9, fig. 6 (1793). – *Trichomanes canariensis* L., Sp. pl., ed. I, p. 109 (1753).

BAETICA: Sierra de Palma, pr. Los Barrios (Cádiz), ad 100 m alt.

Leg. Gros, 8 maji 1922.

WELYTERIS POZOI (LAG.) C. V. MORTON 1959 Bull. Soc. Bot. Fr. 101 239

2. *Pleurosorus Pozoi* (Lag.) Diels

Nat. Pfl.-Fam., I, 4, p. 245 (1893) – *Hemionitis Pozoi* Lag., Gen. et Spec., p. 33 (1816). – *Ceterach Pozoi* A. Br. ap. Milde, in Bot. Zeit., 1866, p. 310. – *Grammitis hispanica* Coss., Not. quelqu. pl. Esp., p. 48 (1849). – *Ceterach hispanicum* Mett., Fil. Hort. Lips., p. 80 (1856).

BAETICA: in fissuris rupium calcareum umbrosis prope Grazalema, ad 1000 m alt.

Leg. Font Quer, 30 junii 1925.

3. *Cheilanthes hispanica* Mett.

in Abh. Senkenb. Naturf. Ges., 1859-61, p. 74.

BAETICA: Sierra Morena, l. «Estrecho de Piedra Galana» dicto, prope Despeñaperros, solo schist., ad 600 m alt.

Leg. Gros, 12 oct. 1925.

4. *Agrostis delicatula* Pourr. ex LAPEYR. 1818

(*Chloris* Hisp., ined.) ap. Kunth, Enum., I, p. 291 (1833) teste Pau.

CASTELLA NOVA: in arenosis prope Navacepeda (Avila).

Leg. Gros, 27 julii 1924.

56. × *Acer Avilae* F. Q. et Rothm.

[*A. monspessulanum* L. × *A. Opalus* Mill. ssp. *granatense* (Boiss.)
F. Q. et Rothm. var. *nevadense* (Boiss. ap. Pax) F. Q. et Rothm.]

BAETICA: in declivibus calcareis, montis Sierra de la Nieve, ad
1800 m alt. Cotypus.

Leg. Gros, 4 julii 1922.

Descr.: Ab *A. Opalo* differt foliis proportionaliter latioribus, sub-
trilobatis, lobulis inferioribus brevissimis vel obsoletis, lobulo supe-
riore mediam folii partem attingente. Ab *A. monspessulano* foliis
subquinelobatis, distincte dentatis discrepat. Fructi videtur frus-
trati. Cf. Ceballos et Vicioso, Est. veget. y fl. Málaga,
p. 211 (1933).—FONT QUER et ROTHMALER.

57. *Acer monspessulanum* L.

Spec. pl., ed. I, p. 1056 (1753).

f. *genuinum* Pax

Bot. Jahrb. VII, p. 229 (1886)

BAETICA: en declivibus umbrosis montis Cerro Gordo, prope Graza-
lema, solo calcareo, ad 1000 m alt.

Leg. Gros, 12 junii 1922.

58. *Acer monspessulanum* L.

Spec. pl., ed. I, p. 1056 (1753).

f. *acutilobum* F. Q. et Rothm. nov. f.

BAETICA: in declivibus calcareis montis Sierra de la Nieve, prope
Ronda, ad 1800 m alt. Cotypus.

Leg. Gros, 21 julii 1925.

Descr.: Diff. lobis foliorum acutis, repando-denticulatis. — FONT
QUER et ROTHMALER.