

579

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM

Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

SCHEDAE
AD
FLORAM IBERICAM SELECTAM

Dec. 1888

IMPENSIS FRANTIS BARCELONENSIS
MDCCLXXXVIII
MADRID

aleph

SCHEDAE

AD

FLORAM IBERICAM SELECTAM



Cent. I

Dec. 1934

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS

Apart. 593

BARCINONE

2° 13185

INSTITUTUS BOTANICUS BARCINONENSIS
FLORA IBERICA SELECTA

Cent. I

Dec. 1934

1. *Davallia canariensis* (L.) Sm.

in Mem. Ac. Turin, V, p. 414, t. 9, fig. 6 (1793). – *Trichomanes canariensis* L., Sp. pl., ed. I, p. 109 (1753).

BAETICA: Sierra de Palma, pr. Los Barrios (Cádiz), ad 100 m alt.

Leg. Gros, 8 maji 1922.

WELYTERIS POZOI (LAG.) C. V. MORTON 1959 Bull. Soc. Bot. Fr. 101 239

2. *Pleurosorus Pozoi* (Lag.) Diels

Nat. Pfl.-Fam., I, 4, p. 245 (1893) – *Hemionitis Pozoi* Lag., Gen. et Spec., p. 33 (1816). – *Ceterach Pozoi* A. Br. ap. Milde, in Bot. Zeit., 1866, p. 310. – *Grammitis hispanica* Coss., Not. quelqu. pl. Esp., p. 48 (1849). – *Ceterach hispanicum* Mett., Fil. Hort. Lips., p. 80 (1856).

BAETICA: in fissuris rupium calcareum umbrosis prope Grazalema, ad 1000 m alt.

Leg. Font Quer, 30 junii 1925.

3. *Cheilanthes hispanica* Mett.

in Abh. Senkenb. Naturf. Ges., 1859-61, p. 74.

BAETICA: Sierra Morena, l. «Estrecho de Piedra Galana» dicto, prope Despeñaperros, solo schist., ad 600 m alt.

Leg. Gros, 12 oct. 1925.

4. *Agrostis delicatula* Pourr. ex LAPEYR. 1818

(*Chloris* Hisp., ined.) ap. Kunth, Enum., I, p. 291 (1833) teste Pau.

CASTELLA NOVA: in arenosis prope Navacepeda (Avila).

Leg. Gros, 27 julii 1924.

~~LEUCANTHEMOPSIS pallida~~ (MILLER) HEYWOOD 1975 An. Inst. Bot. Carnegiae 32(2) 182 **LEUCANTHEMOPSIS**

90. *Tanacetum pallidum* (Mill.) Maire

ap. Emb. et Maire, Pl. Maroc. Nov., p. 4 (1929). — *Chrysanthemum pallidum* Miller, Garden. Dict., ed. VIII, Chrys., n.º 12 (1768). — *Pyrethrum pallidum* (Mill.) Pau, Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 1906, p. 86.

CASTELLA NOVA: in collibus schistosis prope El Escorial, ad 1300 m alt. Loc. class.

Leg. Font Quer, 24 maji 1934.

~~LEUCANTHEMOPSIS pulverulentum~~ (LAG.) HEYWOOD 1975 loc. cit. 184

Obs.: Haec planta ad formam typicam Milleri: *Tanacetum pallidum* (Mill.) Maire ssp. *pulverulentum* (Lag.) F. Q. et Rothm. nov. comb. [= *Pyrethrum pulverulentum* Lag., Var. Cienc., p. 40 (1805)] f. *sulphurea* (Boiss. et Reut.) spectat. — FONT QUER et ROTHMALER.

LEUCANTHEMOPSIS

91. *Tanacetum pallidum* (Mill.) Maire

ap. Emb. et Maire, Pl. Maroc. Nov., p. 4 (1929).

ssp. *spathulifolium* (Gay) F. Q. et Rothm., nov. comb.

Pyrethrum spathulaefolium Gay, ap. Webb et Heldr., Cat. pl. Hisp. a Blanco lect., n.º 520 (1850). — *P. pallidum* (Mill.) Pau var. *spathulifolium* (Gay) Pau in Butll. Inst. Cat. Hist. Nat., 1906, p. 92. — *P. leucanthemifolium* Porta et Rigo, Veget. Itin. Iber., p. 34 (1892). *ssp. spathulifolium* (GAY) HEYWOOD loc. 1975 183

MURCIA: Sierra de Alcaraz, in saxosis calcareis montis Padrón de Bienvenida, ad 1600 m alt. Loc. class. auct. PORTA et RIGO.

Leg. Cuatrecasas, 4 julii 1923.

92. *Jurinea Fontqueri* Cuatrecasas

in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., XXVII, p. 221, t. 2 (1927).

BAETICA: Sierra Mágina, in glareosis calcar. montis Cárceles, ad 1900 m alt. Cotypus.

Leg. Cuatrecasas, 5 julii 1926.

←