

5368

F 806

BB
A

#

Sagascia noronensis.

Genera et species Plantarum
in Horto Bot. Matriti
cultarum.
in L^o. Matriti 1806.

MUSEUM
D'HISTOIRE
NATURELLE

GENERA

BB
819A

ET SPECIES PLANTARUM, QUAE AUT NOVAE SUNT,

AUT NONDUM RECTE COGNOSCUNTUR.

AUCTORE MARIANO LAGASCA.

EX LIBRIS C. PAU



SUPERIORUM PERMISSU.

MATRITI EX TYPOGRAPHIA REGIA.

ANNO MDCCCXVI.

Re. 13. 195 1816

GENERUM

SPECIERUMQUE PLANTARUM NOVARUM

AUT MINUS COGNITARUM

DIAGNOSES.

CLASSIS I. MONANDRIA.

ORD. MONOGYNIA.

1. *LOPEZIA minuta*: herbacea: foliis sparsis ovato-lanceolatis eroso-dentatis: floribus racemosis.

H. in N. H. ? ○.— Praedicto nomine accepimus ex H. P. ann. 1815.

2. *LOPEZIA oppositifolia*: herbacea: foliis ovatis dentato-serratis plerisque oppositis, superioribus sparsis; floribus racemosis.

L. annua, *Cer. Sem.* ann. 1814.

H. in N. H. ○.

3. *LOPEZIA miniata*: fruticosa: foliis denticulatis caulibus ovato-lanceolatis, rameis lanceolatis. — *Petala miniata*.

Hab. in Nova Hisp. ? Semina misit D. Serré, ann. 1804.

ORD. DIGYNIA.

4. *CORISPERMUM glomeratum*: glaberrimum laeve: foliis lineari-lanceolatis caule longioribus: spicis foliosis squarrosis caulem obtegentibus.

Patria ignoratur. Introducta ex H. P. an. 1806. *Corispermum salsoloides* nomine. ○. (V. v.)

G. N. ASPICARPA.

Character gen.

Corolla (calix Lin. et Juss.) calyciformis, 5-fida, basi tribracteata. Stamen brevissimum hypoginum. Anthera solida. Ovaria duo, alterum constanter fatiscens. Stylus. O. Stigma.... Nux coriacea. monosperma.

Ord. nat. ? Apocineae, Juss. ?

5. *ASPICARPA urens*. — *Planta* herbacea, perennis, volubilis. Caulis pilis urentibus hispidus. Folia opposita, breviter petiolata, cordato-ovata, integerrima, subtus praecipue pubescentia. Pedunculi axillares, 3-fidi, 3 flori, bracteati: Stigma neque nudis, neque armatis oculis unquam rimare potui, etsi centies

perscrutaverim. Semen exalbuminosum, cumque integumenta duo corculos 2-3-5-septemve involvunt, haud secus ac in Citro.

H. in N. H. ♀. — *Nux. viperæ* caput refert, unde Generis nomen.

CLASSIS II. DIANDRIA.

ORD. MONOGYNIA.

6. *GRATIOLA crassifolia*: foliis lanceolatis integerrimis crassis: pedunculis unifloris: caule erecto. — *Caulis* inferne radicans. *Stigma* bilamellatum.

H. locis udicis circa Salmanticam. ♀. — Floret aestate.

SALVIA † *Calicis dentibus 5. subaequalibus.*

7. *SALVIA Hispanorum*: albedo-tomentosa: foliis lanceolatis crenulatis rugosissimis calicibus cylindraceis acutis.

Salvia cretica angustifolia. *Cluss. Hist. r. pag. 343*: plantam nostram sat bene repraesentat.

Abunde venit in collibus aridis mediocriis altitudinis in Hispania. *Suffrutex.*

Salvia, Salvia fina, Selvia et Madreselva, vulgo ab Hispanis nuncupatur. — Hujus plantae campboriferæ infusum theiforme, vel et saturativum decoctum, optimum est remedium, quo nervi studiis nimis, curis, laboribus, vigiliisve protractis labefactati, optime, cito, nec injucunde, reficiuntur. Medici nostrates, quin et vulgus ipsum Paralyssi laborantibus folia martianica praescribunt.

† †. *Calycibus, labio superiore 3-dentato.*

8. *SALVIA odorata*: foliis ovato-oblongis subcordatis acuminatis erosis rugosissimis subtus niveo-tomentosis: caule superne paniculato.

S. odorata. *Hornem. Hort. baffn. v. i. pag. 33.* H. prope Bagdad. *Horn. loc. cit.* Introducta supradicto nomine ex H. P. ann. 1804. ♀. — Caulis adscendens, superne paniculatus florifer. — Verticilli summi steriles.

9. *SALVIA parviflora*: foliis cordato-ovatis acutis erosis crenatis: bracteis verticillo

ris fructiferis retroflexis. *Lag. Variedades ann.* 2. n. 19. pag. 40.

Helianthemum retrofractum. Pers. Encybir. 2. p. 78.

Venit locis arenosis siccis juxta oppidum *Chamartin. O.*

216. *CYTRUS Calot*: petiolis alatis: foliis lanceolatis crenato-serratis acuminatis: fructu sphaerico parvo.

Limon pusillus calaber. *Ferr. Hesperid. pag. 209. tab. sive pag. 211.* Icon bona fructu majori minorique.

Limon de carne, et Limon de confitar vulgo dicitur.

Colitur in hortis orcelitanis.

Floret primo vere. 2.

ORD. TRIGYNIA.

217. *EUPHORBIA nutans*: caule patulo dichotomo villosio: ramis apice fructiferis nutantibus: foliis ovato-oblongis subcordatis obsolete serratis: floribus axillaribus solitariis.

Habit. in N. H. O.

218. *EUPHORBIA gemella*: caule prostrato-ramoso piloso: foliis oppositis oblique cordatis inaequaliter dentatis: florum capitulis terminalibus geminis.

H. in N. H. O.

219. *EUPHORB. pusilla*: umbella 2-3 fida: involucri oblongis obtusis, involucrellis ovatis: corollis 4-petalis: foliis cuneatis, superioribus angustioribus.

Habitat in Orcelitano monte Sti. Michaelis, juxta Seminarium conciliare ejusdem nominis.

Floret Martio. O.

220. *RESEDA lanceolata*: floribus 3-gynis: calycibus 7-partitis: foliis lanceolatis petiolatis: petiolis utrinque unidentatis.

Habitat locis montosis in Regno Jenensi et Granatensi. — Floret aestate. O.

221. *RESED. erecta*: floribus pendulis trigynis: fructibus erectis oblongis: caule ramisque virgatis: foliis tripartitis indivisisque: calycibus sexpartitis linearibus inaequalibus. Pedicelli setacei nutantes: fructiferi erecti, firmiores.

Venit in collibus cretaceis prope *Fumilla* oppidum in Murciae Regno, tum et circa *Aranjuez*, alibique in Hispania.

Floret Junio et Julio. O.

222. *RESEDA media*: floribus 3-gynis: calycibus corolla longioribus 6-partitis: petalis superioribus capillaceo-multifidis: foliis integris 3-lobisque.

Hab. in Hispania meridionali. O.

ORD. POLYGYNIA.

223. *SEMPERVIVUM anomalum*: glaberrimum: foliis subulatis carnosis basi solutis: propaginibus cilindricis: calycibus sex-decemfidis.

Hab. in incultis sabulosis Regni Valentini, juxta *Chamartin* et *Guadarrama* oppida, atque in veteri Castella.

Floret Majo. L.

G. N. BALMISA.

Charact. gener. differ.

SPATHA oblonga, tubulosa, apice cucul-

lato-fornicata. *Stam.* filamentosa, antheris reniformibus, unilocularibus. *Ovaria* stylifera. *Bacca* exsucca, membranacea, polysperma. *Spadyx* imberbis.

224. *BALMIS vulgaris*: foliis cordato hastatis: spatulae apertura ovata: spadyce incurvo apice subclavato.

Aris. serpentinum. *Barrel. ic. tab. 573.* — *Arum Arisarum. Linn.*

Hab. in arvis et locis ruderatis in Hispania meridionali.

Floret ab Autumno ad Ver usque. L.

225. *CLEMATIS semitriloba*: cirrhis oppositis scandens: foliis simplicibus cordatis serratis plerisque trilobis: ramis angulatis.

— *Rami* angulati, atropurpurei. *Folia* profunde serrata. *Pedunculi* uniflori, axillares, solitarii, supra medium involucreti, involucre bifido, laciniis rotundato-subcordatis, post anthesim latioribus reflexis. *Petala* 4, ovata, extus tomentosa. — *Clemat. cirrhosae Linn.* similima.

Hab. in Hispania meridionali? 5.

226. *CLEMATIS canaliculata*: suffruticosa scandens: foliis decompositis, foliolis linearibus canaliculatis: pedunculis axillaribus subtrifloris.

H. in Murciae et Granatae Provinciis locis saxosis, petrosisque. — Floret Vere.

CLASSIS XIII. DIDYNAMIA.

ORD. GYMnosPERMIA.

227. *TEUCRIUM subtriphyllum*: spicis oblongis: foliis oblongis tomentosis crenatis planiusculis oppositis, ternisque.

Polium montanum luteum, supinum capite oblongo. *Barrel. obs. 320. Icon. 1082* bona.

Teucrium trifoliatum Vahl?

g. foliis verticillato ternis.

Habitat in montibus Jenensis Regni, ubi *Tomillo blanco* vulgo appellatur. — Floret Aestate et Autumno. L.

228. *TEUCRIUM lanigerum*: caule capitulisque subovatis lanigeris: foliis crenato-pinnatifidis linearibus oblongis revolutis.

Habit. in Regno Granatensi. *D. Clemente* legit. *Suffrutex* semipedalis, vel parum amplius.

229. *TEUCRIUM compactum*: foliis cuneato-ovatis inciso-crenatis hirtis, floralibus petiolatis lanceolatis ciliatis: floribus spicatis.

Teucr. compactum. Clem.

— *Suffrutex* semi-r-pedalis, procumbens, pilis albis mollibus hirtis. *Folia* basi integerrima, in petiolum brevem angustata: floralia petiolata, lanceolata, acuta, ciliata, calycem superantia. *Calix* inflatus, fauce angustatus, semiquinquefidus: laciniis inaequalibus, acutis, superiore ovata brevior.

Habit. in Granatensi Regno, ubi legit praed. *D. D. Clemente.*

230. *SIDERITIS leucantha*: suffruticosa: ramis subincanis: foliis lanceolatis acutis mucronato-aristatis, utrinque 1-2-dentato-mucronatis: verticillis distantibus: bracteis subcordatis dentato-aristatis brevibus.

Sid. leucantha. *Cav. Ic. 3. t. 304.*

Spicae elongatae flexiles, verticilli 6-flori. *Calyx* subcampanulatus, aristatus. Corolla al-

ba, galea semibifida, laciniis divaricatis, obtusis.

Hab. locis aridis calcareis in *Urbillo* monte, alibique circa *Orceim*.

231. *SIDERITIS angustifolia*: suffruticosa pubescens: foliis linearibus acutis integerrimis: bracteis cordato-rotundatis dentato-spinosis verticillo brevioribus.

Sideritis montana variegulato folio. *Barrel. rar. Icon.* 344. bona.

Folia inferiora conferta, breviora, obtusiuscula, subincana.

Habitat in montibus Regni Valentini, et praesertim circa *Canales* oppidum. — Floret Vere.

232. *SIDERITIS Tragoriganum*: suffruticosa subincana: foliis linearibus extrorsum laetioribus subdentatis obtusiusculis mucronatis: bracteis cordatis serratis, dentibus aristatis.

Sider. Tragoriganum. Elench. H. R. M. ann. 1803.

α. Verticillis imbricatis.

β. Verticillis distinctis. — *Tragoriganum* alterum. *Class. Hist. 1. pag.* 355. — *Tragoriganum Cusii. Lobel. Icon.* 494.

Suffrutex subpedalis, pube molli subincanus.

Folia caulina duo supra lanceolata, serrata, qua nota facile a praecedenti et sequenti distinguitur. *Verticilli* numerosi, imbricati, aut distincti, adproximati, in spicam terminalem, 3-5-pollices longam digesti.

Habitat in Murciae et Valentiae Regnis. Circa *Tibi* oppidum legi, ubi *Rabet de Gat* vulgo dicitur.

233. *SIDERITIS linearifolia*: caule suffruticosa pubescente: foliis linearibus acutis mucronatis trinerviis integerrimis: dentibus bractearum calycumque spinulosis. — *Sider. linearifolia. Pers. Enob. bot. 2. p.* 117.

α. Verticillis densè imbricatis. — *Sider. montana hyssopifolia* major. *Barrel. rar. Ic.* 329.

β. Verticillis subdistinctis. — *Sideritis montana hyssopifolia* minor. *Barrel. rar. Ic.* 172.

Caulis pilis rariusculis pubescens, scabriusculus.

Folia virentia, subvillosa. *Bractee* cordato-ovatae, basi apiceque integerrimae, ad medium utrinque dentato-spinosae, calycibus longiores.

Habitat in montibus Regni Valentini, atque circa *Miranda de Ebro* oppidum alibique in veteri *Castella*.

234. *SIDERITIS foetens*: suffruticosa: foliis linearibus glabris acutis: spicis densis: calycibus frutescentibus fauce barbatis.

Sider. foetens. Clem.

Suffrutex sesquialinaris, caule ramisque virgatis, junceformibus, glabris. *Pedunculi* villosi. *Spicae* cylindraceae, a sesquipollice ad quinque pollices longae, verticillis 12-24 et ultra dense imbricatis. *Bractee* ovatae, subcordatae, profunde inciso-serratae, dentibus subulato-aristatis, verticillo breviores. *Calicis* dentes subulato-aristati, faux pilis longis dense barbata. *Corolla* longitudine calicis, alba.

Prope *Nijar* oppidum legitur. *D. D. Clemente*, in *Granatensi* Regno.

235. *SIDERITIS Cavanillesii*: subincana: foliis lanceolatis dentato-serratis: spica elon-

gata verticillis distinctis: bracteis cordato-orbiculatis spinoso-dentatis.

Sid. scordoides. Cav. Ic. 4. tab. 303. non *Linnaei*.

Habitat locis montosis Regni Valentini, circa *Matritum*, et in veteri *Castella*.

Caulis tomentosus, nec hirtus. *Folia* subtus praecipue tomentosa, magis minusve incana. *Corolla* flava.

236. *SIDERITIS spinosa*: foliis lanceolatis utrinque inciso-subdentato-spinosis: bracteis cordato-orbiculatis inciso-dentatis spinosis verticillo longioribus.

α. *Caulis* foliisque tomentoso-hirsutis. — *Sider. spinosa. Vahl. Symb. 1. p.* 41. — *Lam. Dict. 2. p.* 168.

β. *Caulis* foliisque glabriusculis. — *Sider. subspinosa. Cav. Ic. 3. t.* 209.

Folia extrorsum latiora, ad medietatem dentibus mucronato-spinosis duobus tribusve utrinque excisa. *Spica* subpollicaris, verticillis imbricatis.

237. *SIDERITIS serrata*: foliis anguste lanceolatis utrinque acutis argute serratis, dentibus mucronatis: bracteis dentato-spinosis. — *Sider. spinosa Cav. herb.*

Planta suffruticosa, hirsuta, exsiccata tota sordide flavet. — *Folia* lanceolata, angusta, utrinque acuta, apice mucronata, serrata, serraturis utrinque sex-octo, pluribusve, mucronatis, trinervata, duplo longiora quam in praecedenti, tres lineas lata.

Habitat in montibus dittonis *Tobarra* oppidi in Murciae Regno.

238. *STACHYS valentina*: foliis oblongo-lanceolatis, subcordatis hirtis: verticillis 6-7-floris summis sterilibus. *Lugas. Varied. loc. citat.*

Habit. in collibus *Enguerae* oppidi in Regno Valentino.

239. *SATUREJA obovata*: pedunculis axillaribus subcymosis secundis foliosis: calycinis segmentis muticis: foliis carinatis obovatis obtusis integris.

Venit ad saxorum calcareorum rimas in australiori Hispania.

Floret Vere et Aestate.

Saldorija Orceitani et Murcitanii appellant. Valentini *Herba d'olive* vulgo audit. — Ad fructus oleae condendos adhibetur.

240. *THYMUS capitatus*: spicis capitatis bracteatibus: bracteis lanceolatis acutis ciliatis: foliis linearibus.

Juxta viam, quae ab urbe Alonsesi ad *Helche* oppidum ducit legebam Majii mense anno 1810.

ORD. ANGYOSPERMIA.

241. *VERBENA polycnemoides*: floribus axillaribus geminis sessilibus: foliis connatis subulatis subpungentibus.

Suffrutex ramosissimus *Plycnemi arvensis* facie. — Hab. in Plantie Bonariensi. (V. S.)

242. *VERBENA ligustrina*: foliis ovatis, oblongisque scabris margine revolutis integerrimis: spicis cylindraceis terminalibus.

Hab. in *Portu desiderato*.

243. *VERBENA thymifolia*: spicis capitatis terminalibus siliatis: foliis ovatis ciliato-scabris margine revolutis: caule suffruticosa.

Suffrutex pygmaeus, ramosissimus *Her-*